



Diagnostiek van urineweginfecties

Verdenking UWI met verblijfskatheter

≥1 van de volgende symptomen:

Koorts (>37.8°C) >24 uur

Nierslagpijn

Koude rillingen

Duidelijk delier, na uitsluiten urineretentie als oorzaak

OF

Urineverlies naast de katheter of macroscopische hematurie bij sonde voorheen goed lopende sonde



Verwijder de katheter en neem urinestaal af na reiniging genitale regio met water

Wanneer het verwijderen van een katheter niet mogelijk is → vervang de katheter en neem een urinekweek af nadat de nieuwe katheter geplaatst is.

Ontsmet de prikplaats met alcohol 70% en aspireer urine met steriele naald (niet uit urinecollector). Behoud het gesloten systeem

Schrijf empirische antibiotica voor (cfr verder)



Zend urinestaal binnen de 2 uren naar het labo

Indien niet mogelijk: bewaar urine in de koelkast (2-8°C) gedurende maximaal 24u



Diagnose van urineweginfecties

Verdenking UWI zonder
verblijfskatheter

≥1 van de volgende symptomen:
Koorts (>37.8°C)
Koude rillingen
Dysurie
+
≥1 van volgende recent ontstane symptomen:
Mictiedrang
Frequente mictie
Hematurie
Urine-incontinentie
Zichtbare urethrale pus
Pijn/gevoeligheid in de nierloge (flankpijn)
Suprapubische pijn

Afname midstream urinestaal na reiniging
genitale regio met water (alternatief:
eenmalige katheterisatie) VOOR opstart
antibiotica

Zend de urine binnen de 2 uur naar het labo
Indien dit niet mogelijk is, bewaar de urine in
de koelkast (2-8°C) gedurende maximaal 24
uur

≥2 van volgende recent ontstane symptomen:
Mictiedrang
Frequente mictie
Hematurie
Urine-incontinentie
Zichtbare urethrale pus
Pijn/gevoeligheid in de nierloge (flankpijn)
Suprapubische pijn

Andere symptomen zoals verandering in kleur,
geur, troebele urine, → Overweeg andere
oorzaak voor de klachten.
Blijf bewoner actief monitoren
Heroverweeg als nieuwe klachten ontstaan of
als bestaande klachten niet verdwijnen