

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar zoals bij alle medicatie kunnen ook na de toediening van Infectafer mogelijk klachten ontstaan, waaronder:

- Hoofdpijn, duizeligheid, het heet hebben, bloeddrukstijging en misselijkheid.
- Allergische reacties zoals uitslag, jeuk, een moeilijke/piepende ademhaling, het opzwellen van de lippen, de keel en de tong.

Bij een van bovenstaande klachten of andere reacties of symptomen na opname, vragen wij u om onmiddellijk de (huis)arts te verwittigen.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel ze zeker aan de verpleegkundige of (huis)arts.

Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze folder.

DAGZIEKENHUIS GERIATRIE

03 760 75 78
dagziekenhuis.geriatrie@vitaz.be



INFORMATIEFOLDER

INJECTAFER

VITAZ vzw

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 60 60
info@vitaz.be | www.vitaz.be
BE 0881.291.322 | RPR Gent
Art. 19550 | v1 | 09/10/2024

U werd doorverwezen naar het dag-ziekenhuis geriatrie voor het toedienen van een infuus met Injectafer. Deze folder geeft meer informatie over deze behandeling.

WAT IS BELANGRIJK OM TE WETEN OVER DIT GENEESMIDDEL

Injectafer is een ijzerpreparaat voor intraveneuze toediening. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam, bij een tekort aan ijzer (anemie). Ijzer is essentieel voor ons lichaam, het is betrokken in tal van centrale processen. De belangrijkste functie is het zuurstoftransport doorheen ons lichaam.

We halen ijzer uit de voeding. Een evenwichtige, gevarieerde voeding die voldoende ijzerhoudende voedingsmiddelen bevat, waaronder vlees, gevogelte, vis, granen, peulvruchten, samen met veel groenten en fruit, is essentieel.

Waarom Injectafer toedienen?

Indien er niet voldoende ijzer wordt opgenomen in het lichaam worden medicijnen toegediend via tabletten of een infuus.

Injectafer wordt toegediend om het ijzertekort te behandelen wanneer:

- de toediening van ijzer via tabletten niet voldoende is;
- de behandeling van ijzer via tabletten niet verdragen wordt;
- u zeer snel ijzer nodig hebt om de ijzervoorraad in uw lichaam op te bouwen.

De diagnose ijzertekort moet aangetoond zijn aan de hand van een bloedafname.

TOEDIENEN VAN INJECTAFER

Vorbereiding

Voordat de behandeling met Injectafer wordt opgestart zal de geriater op basis van de laboresultaten van de bloedafname bepalen of u Injectafer mag toegediend krijgen en welke dosis Injectafer u nodig heeft. Daarnaast zullen er vooraf enkele vragen worden gesteld door de verpleegkundige en uw parameters (bloeddruk, temperatuur, hartslag) genomen worden.

Breng voor de behandeling de arts op de hoogte van:

- de medicatie die u nu (of tot voor kort) inneemt;
- de aanwezigheid van eventuele infecties;
- gekende allergieën, ernstige astma, eczeem of andere atopische allergie, immuun- of inflammatoire aandoeningen.

Toediening

Injectafer wordt toegediend via een infuus op de hand of de arm. Drink de uren volgend op de toediening zeker voldoende.

Nazorg

Er wordt gevraagd om nog minstens 30 minuten na toediening van het infuus op de afdeling te blijven, zodat u in geval van bijwerkingen meteen geholpen kan worden door de verpleegkundige of geriater.